

Przygotowanie pacjenta do scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego

Badanie przeprowadzane jest w ciągu dwóch dni: jednego dnia odbywa się badanie spoczynkowe z podaniem izotopu, zaś drugiego dnia przeprowadzana jest próba wysiłkowa lub farmakologiczna (z lekiem) z podaniem izotopu. Czas pobytu w zakładzie związany z przeprowadzeniem każdego z badań wynosi 3-4 godzin.

Badanie spoczynkowe - data i godzina:

- dwa dni przed badaniem nie należy spożywać wzdymających potraw i surowych owoców;
- w dniu poprzedzającym badanie należy spożyć lekkostrawną kolację, wskazane jest także przyjmowanie leków działających przeciw wzdęciom jelit (Espumisan)
- Pacjent zgłasza się na badanie do zakładu medycyny nuklearnej na umówioną godzinę, z dokumentacją lekarską.
- 2 godziny przed badaniem nie należy spożywać pokarmów, można pić wodę mineralną niegazowaną.
- Jeśli lekarz kierujący nie zalecił inaczej, przed badaniem i w dniu badania należy zażyć normalnie przyjmowane leki, popijając je wodą.
- należy przynieść ze sobą tłusty posiłek, np. jeden z podanych zestawów: śmietana 18%, dwa plastry sera żółtego (5 dkg), jedno jajko ugotowane na twardo. Posiłek ten należy spożyć po podaniu radiofarmaceutyku, pacjent zostanie o to poproszony przez personel zakładu.
- przez dwie doby po badaniu należy ograniczyć kontakt z innymi ludźmi, zwłaszcza małymi dziećmi i kobietami w ciąży

Badanie wysiłkowe - data i godzina:

- dwa dni przed badaniem nie należy spożywać wzdymających potraw i surowych owoców
- w dniu poprzedzającym badanie należy spożyć lekkostrawną kolację, wskazane jest także przyjmowanie leków działających przeciw wzdęciom jelit (Espumisan).
- Pacjent zgłasza się na badanie do zakładu medycyny nuklearnej na umówioną godzinę, z dokumentacją lekarską.
- 2 godziny przed badaniem nie należy spożywać pokarmów, można pić wodę mineralną niegazowaną.
- Jeśli lekarz kierujący nie zalecił inaczej, przed badaniem i w dniu badania należy zażyć normalnie przyjmowane leki, popijając je wodą.
- należy przynieść ze sobą tłusty posiłek (taki sam jak przy badaniu spoczynkowym), np. śmietanę 18%, dwa plastry sera żółtego (5 dkg) i jedno jajko ugotowane na twardo. Posiłek ten należy spożyć po podaniu radiofarmaceutyku, pacjent zostanie o tym poinformowany przez personel zakładu.
- należy założyć wygodne, luźne ubrania w celu sprawnego odbycia próby wysiłkowej
- przez dwie doby po badaniu należy ograniczyć kontakt z innymi ludźmi, zwłaszcza małymi dziećmi i kobietami w ciąży
- Mężczyźni powinni ogolić klatkę piersiową w domu w dniu poprzedzającym badanie.

Wynik badania należy odebrać w rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej tydzień po badaniu.